

A tapasztalat biztonságot jelent

39 év tapasztalat az emlőrák endokrin terápiájában*



FASLODEX®
fulvesztrant

Zoladex®
goszerelein



Arimidex
anasztrozol

*Az AstraZeneca 1973.08.30-án Nagy Britanniában törzskönyvezi a Nolvadexet (tamoxifen)

Rövidített alkalmazási előírások

FasloDEX 250 mg oldatos injekció

Hatóanyag: 250 mg fulvesztrant 5 ml oldatban, előretöltött fecskendőben. **Terápiás javallatok:** A FasloDEX posztmenopauzában lévő nők ösztrogénreceptor pozitív, lokálisan előrehaladott vagy metasztázusos emlőrákjának kezelésére javallt adjuváns antiösztrogén terápia alatti, vagy azt követő réagszubsiban, illetve amikor antiösztrogén terápia mellett a betegség progrediál. **Adagolás:** Felhótt korú nők (beleértve az időseket is): Az ajánlott adag 500 mg havonta egyszer, valamint egy további 500 mg-os adag két héttel a kezdő dózis után. Két egymást követő 5 ml-es injekció adandó lassú (1-2 perc/injekció) intramuscularis injekció formájában az egyik, illetve a másik tarzomból. **Ellenjavallatok:** a hatóanyaggal vagy bármely segédanyaggal szembeni érzékenységi reakció, terhesség és szoptatás, súlyos májbetegség. **Mellékhatások:** Nagyon gyakori az injekció beadásának helyén jelentkező reakciók, éhségtelenség, szédülés, migrén, szédülés, osteinergia, myelómia-szerűtlen emelkedés (ALI, AST, ALP) Gyakori: fejfájás, hányás, hasmenés, anorexia, húgyúti fertőzések, vérszintrombolás, hidrulémia, hatóanyag-túlérzékenységi reakciók, kiütés. **Óvintézkedés:** Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvos/kórház diagnózist követően folyamatos szakorvos ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz) EU/1/03/269/002. Kérjük, olvassa el a gyógyszer részletes alkalmazási előírását! (2013. január 17.) Ár: FasloDEX 250 mg oldatos injekció fagy ár: 111 467 Ft; 100% 8/4; TB támogatás: 111 167 Ft; férfélesi díj: 300 Ft. Az időköl változások a www.oep.hu honlapon (Szakmai kezdőlap/gyógyszer) érhetőek el.

Zoladex depot 3,6 mg implantátum előretöltött fecskendőben

Hatóanyag: 3,6 mg goszerelein (goszerelein-acetát) formájában. **Terápiás javallatok:** Prostatocarcinoma kezelése. Pre- és perimenopausa idején jelentkező hormonérzékeny emlőcarcinoma kezelése. Endometriosis: műtét előtt súlyos endometriosis folyamatos kezelésére, legfeljebb 6 hónapig; a fibromák méretének csökkentésére legfeljebb 3 hónapig. **Endometrium-elvékonyítás:** az endometrium elvékonyítása ablatio előtt. Két Zoladex 3,6 mg implantátum alkalmazandó 4 hetes különbséggel, úgy, hogy a tervezett műtét a második implantátum alkalmazását követő 2 héttel essen. **Fertilizációs kezelés:** in vitro fertilizáció; a hipofízis működésének, „down regulációját” a gonadotropin kezelést (vagy ovuláció indukciót) megelőzően. **Adagolás:** 28 naponként egy Zoladex 3,6 mg depot implantátum alkalmazandó szubkután az előző hasfalra. **Ellenjavallatok:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyaggal szembeni érzékenységi reakció, terhesség és szoptatás időszakai. **Mellékhatások:** Férfiak: nagyon gyakori: hőhullámok, veritékezés, libidócsökkenés, potencia-csökkenés; gyakori: parosethesia, spinális kompressió, vérmegnyugodás, bőrkéreg, csontfájdalom, emésztőzavar, az injekció beadásának helyén fellépő reakciók (pl. bőrpír, fájdalom, duzzanat, vérzés), a csontok csontanyag-sűrűségének csökkenése, a glükóz-tolerancia csökkenése, testtömeg-növekedés, szívélégelenség, myocardialis infarctus, hangulatváltozások, depressió. Nők: nagyon gyakori: hőhullámok, veritékezés, libidócsökkenés, húvelyszárazság, az emlő méretének változása, az injekció beadásának helyén fellépő reakciók (pl. bőrpír, fájdalom, duzzanat, vérzés), orvosi, gyakori: hangulatváltozások, depressió, parosethesia, fejfájás, vérmegnyugodás, bőrkéreg, arthralgia, a csontok csontanyag-sűrűségének csökkenése, testtömeg-növekedés, alopecia, a panaszok átmeneti és gyorsabb, hirtelen lezárás. **Óvintézkedés:** Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvos/kórház diagnózist követően folyamatos szakorvos ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). Bővebb információt kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! (2012. 08. 22.) OGYI-1-1976/01. Ár: Zoladex Depot 3,6 mg implantátum fagy ár: 38 143 Ft; 100% 8c Sz: 100% 24 Sz; TB támogatás: 37 843 Ft; férfélesi díj: 300 Ft. Az időköl változások a <http://www.oep.hu> honlapon (Szakmai kezdőlap/gyógyszer) érhetőek el.

Arimidex 1 mg filmtabletta

Hatóanyag: 1 mg anasztrozol filmtablettánként. **Javallatok:** Az Arimidex javallt: Posztmenopauzában lévő nők hormonreceptor pozitív, előrehaladott emlőrákjának kezelésére. Posztmenopauzában lévő nők hormonreceptor pozitív, korai invazív emlőrákjának adjuváns kezelésére. Posztmenopauzában lévő nők hormonreceptor pozitív, korai invazív emlőrákjának adjuváns kezelésére, akik 2-3 évi adjuváns tamoxifen kezelést kaptak. **Adagolás:** Az Arimidex ajánlott adagja féltablettának és dőseknak egy darab 1 mg-os tablettát naponta egyszer. Posztmenopauzában lévő nők hormonreceptor pozitív, korai invazív emlőrákjának adjuváns endokrin kezelésének javallt időtartama 5 év. **Ellenjavallatok:** Az Arimidex ellenjavallt: terhesség és szoptatás nők számára. Az anasztrozol vagy a 1 mg-os tablettát felszívó bármely segédanyaggal szembeni érzékenységi reakció esetén. **Mellékhatások:** Nagyon gyakori: hőhullámok, fejfájás, hányinger, bőrkéreg, osteinergia, arthralgia/izületi merevség, arthritisz, osteoporosis. Gyakori: Anorexia, hypercholesterinaemia, aluszékonyság, Corpul-tunnel szindróma, hasmenés, hányás, az alkalikus-foszfát, az alánin-aminotranszferáz és az aszparát-aminotranszferáz szintjének emelkedése, hajhullás, allergia-reakciók, csontfájdalom, myalgia, húvelyszárazság, húvelvi vérzés. **Óvintézkedés:** Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvos közhízi diagnózist követően folyamatos szakorvos ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszer (Sz). Bővebb információt kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! (2013. máj. 03.) OGYI-1-5632/01-02. Ár: Arimidex 1 mg filmtabletták 28x bruttó fogyasztói ár: 7 313 Ft; férfélesi díj: 7 313 Ft; TB támogatás mértéke: 6 817 Ft (EU 100%), 8/1, 8/2; Arimidex 1 mg filmtabletták 84x bruttó fogyasztói ár: 24 959 Ft; férfélesi díj: 300 Ft; TB támogatás mértéke 24 659 Ft (EU 100%), 8/1, 8/2. Az időköl változások a <http://www.oep.hu> honlapon (Szakmai kezdőlap/gyógyszer) érhetőek el.

PARF006H1201139301, Lezárás dátuma: 2013.03.03.

EGFR M+

**Az Iressa az elsőként törzskönyvezett
célzott monoterápia nem kis-sejtes tüdőrákos
betegek első vonalbeli kezelésében
EGFR TK* aktiváló mutáció esetén****



Iressa 250 mg filmtabletta

Hatóanyag: 250 mg gefitinib tablettánként. **Javallat:** Az Iressa olyan, lokálisan előrehaladott vagy metasztitikus, nem-kissejtes tüdőrákban (non-small cell lung cancer, NSCLC) szenvedő felnőtt betegek kezelésére javallt, akiknél fennáll az EGFR-TK (epidermális növekedési faktor receptor-tirozinkináz) aktiváló mutáció. **Adagolás:** Naponta egyszer egy 250 mg-os tablettát. **Ellenjavallat:** A készítmény hatóanyagával vagy bármely segédanyagával szembeni túlérzékenység. Szoptatás. **Nemkívánatos hatások, mellékhatások:** *Nagyon gyakori:* anorexia, hasmenés, hányás, hányinger, stomatitis; az alanin-aminotranszferáz szintjének emelkedése; bőrreakciók, pustulával járó bőrképződés, esetenként viszketéssel, bőrszárazsággal, erythemás alapon; asthenia. *Gyakori:* conjunctivitis, blepharitis és szájszárazság; haemorrhagia, mint például orrvérzés vagy haematuria; intersticiális tüdőbetegség; kiszáradás, hasmenés, hányinger, hányás vagy anorexia következtében; szájszárazság; az aszpartát-aminotranszferáz szint emelkedése, a teljes bilirubinszint emelkedése, körömváltozások, alopecia, a vér kreatinin-szintjének tüneteket nem okozó emelkedése, proteinuria, pyrexia. **Osztályozás:** Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszerek (Sz). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! (2012. április 20.) EU/1/09/526/001, EU/1/09/526/002. A gyógyszerrel részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) internetes honlapján (<http://www.emea.europa.eu/>) található. Tételes elszámolás alá eső készítmény (9/1993.(IV.2.) NM rendelet, 1/A sz. melléklet). Ár: 625 837 Ft. TB támogatás: 100%. Térítési díj: 0 Ft. Az időközi változások a <http://www.oep.hu> honlapon (Szakmai közlőlap/gyógyszer) érhetőek el.

* epidermális növekedési faktor receptor tirozin-kináz

** A forgalomba hozatali engedély első kiadásának dátuma a teljes alkalmazási előírásokban találhatóak: Iressa 250 mg filmtabletta alkalmazási előírás (2012. ápr. 20. EU/1/09/526/001, EU/1/09/526/002), Tarceva 150 mg filmtabletta alkalmazási előírás (2011. aug. 24. EU/1/05/311/003)

AstraZeneca
Összeköt az Egészség

AstraZeneca Kft.
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.
Tel: +36-1-883-6500, Fax: +36-1-883-3336
www.astrazeneca.com

IRESSATM
gefinitib